

برنامه ریزی صفر و یک

دکتر سلیمی فرد
 (PhD in Management Science, Petri Nets, Workflow,
 Lancaster University, UK, 2003)
 گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
<http://salimifard.karsaman.ir>

برنامه ریزی صفر و یک چیست؟

گونه ای ویژه از برنامه ریزی عدد صحیح
 متغییر تصمیم دو ارزشی (صفر یا یک)

نیازمند الگوریتمی ویژه برای حل

$$x_j \in \{0,1\}$$

Binary Integer Programming (BIP)

دکتر سلیمی فرد :: پژوهش عملیاتی 3 :: برنامه ریزی 0-1 :: پنجشنبه، 05/03/2009 2

کاربردهای برنامه ریزی صفر و یک

متغیرهای دو به دو ناسازگار

- اگر حداکثر یکی از متغیرهای یک مجموعه M تایی باید انتخاب شود

$$\sum_{j \in M} x_j \leq 1$$

متغیرهای این یا آن

- اگر تنها یکی از متغیرهای یک مجموعه M تایی بتواند انتخاب شود.

$$\sum_{j \in M} x_j = 1$$

دکتر سلیمی فرد :: پژوهش عملیاتی 3 :: برنامه ریزی 0-1 :: پنجشنبه، 05/03/2009 3

کاربردهای برنامه ریزی صفر و یک

متغیرهای وابسته

- اگر x_k تنها در صورتی انتخاب شود که x_j هم انتخاب شود.
- تصمیم گیری در مورد x_k مشروط به تصمیم در باره x_j است

$$x_k \leq x_j$$

IF ($x_j = 0$) THEN
 $x_k = 0$
 ENDIF

یا

$$x_k - x_j \leq 0$$

دکتر سلیمی فرد :: پژوهش عملیاتی 3 :: برنامه ریزی 0-1 :: پنجشنبه، 05/03/2009 4

کاربردهای برنامه ریزی صفر و یک

هزینه ثابت

- تولید یک محصول (x_j) نیازمند راه اندازی یک خط تولید
- هزینه خرید و راه اندازی (k_j) هزینه ثابت (فقط در صورت راه اندازی)
- هدف کمینه سازی تابع هزینه کل

$$\min Z = \dots + k_j y_j + c_j x_j$$

$x_j \leq U_j y_j$

هزینه تولید هر واحد x_j

تعریف محدودیت وابسته زیر

متغییر تصمیم راه اندازی خط

حداکثر تولید x_j

دکتر سلیمی فرد :: پژوهش عملیاتی 3 :: برنامه ریزی 0-1 :: پنجشنبه، 05/03/2009 5

حل برنامه ریزی 0-1

قابل حل با بررسی همه ترکیبهای ممکن از ارزش متغیرها

روش شمارش صریح (Explicit Enumeration)

- نیازمند 2^n بررسی
- افزایش شگرف مدت زمان اجرا با افزایش شمار متغیرها

دکتر سلیمی فرد :: پژوهش عملیاتی 3 :: برنامه ریزی 0-1 :: پنجشنبه، 05/03/2009 6

الگوریتم شمارش ضمنی

♦ بالاس (Balas) در 1967

♦ راه حلی برای کاهش شمار جستجوها

♦ شناخته شده به نام الگوریتم جمعی

♦ شکل استاندارد

$$\max Z = \sum_{j=1}^n C_j X_j$$

(where $C_j \leq 0$)

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

$$x_j = 0 \vee 1$$

Implicit Enumeration

پنجشنبه، 05/03/2009

دکتر سلیمی فرد :: پژوهش عملیاتی 3 :: برنامه ریزی 0-1

7

استاندارسازی

♦ اگر محدودیت \geq باشد، در -1 ضرب شود

♦ اگر $C_j > 0$ ، تغییر متغیر $y_j = 1 - x_j$

♦ اگر تابع هدف min، در -1 ضرب تا به صورت max

♦ اگر محدودیت = باشد، تبدیل به دو محدودیت \geq و \leq

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i \end{cases}$$

پنجشنبه، 05/03/2009

دکتر سلیمی فرد :: پژوهش عملیاتی 3 :: برنامه ریزی 0-1

8

استاندارسازی

♦ شیوه پیشین، افزایش شمار محدودیتها به $2m$

♦ $m+1$ محدودیت

$$\sum_{j=1}^n a_{1j} x_j = b_1$$

$$\sum_{j=1}^n a_{2j} x_j = b_2$$

$$\sum_{j=1}^n a_{mj} x_j = b_m$$

$$\sum_{j=1}^n a_{1j} x_j \leq b_1$$

$$\sum_{j=1}^n a_{2j} x_j \leq b_2$$

$$\sum_{j=1}^n a_{mj} x_j \leq b_m$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i$$

پنجشنبه، 05/03/2009

دکتر سلیمی فرد :: پژوهش عملیاتی 3 :: برنامه ریزی 0-1

9

یک مثال

♦ مسئله 0-1 زیر را استاندارد کنید:

$$\max Z = 2x_1 - x_2 + 5x_3 - 3x_4 + 4x_5 - 8x_6$$

$$3x_1 - 2x_2 + 7x_3 - 5x_4 + 4x_5 + 2x_6 \leq 6$$

$$-x_1 + x_2 - 2x_3 + 4x_4 - 2x_5 - x_6 \geq 0$$

$$x_j = 0 \vee 1$$

$$x_1 = 1 - y_1$$

$$x_2 = y_2$$

$$x_3 = 1 - y_3$$

$$x_4 = y_4$$

$$x_5 = 1 - y_5$$

$$x_6 = y_6$$

پنجشنبه، 05/03/2009

دکتر سلیمی فرد :: پژوهش عملیاتی 3 :: برنامه ریزی 0-1

10

یک مثال

$$-(1 - y_1) + y_2 - 2(1 - y_3) + 4y_4 - 2(1 - y_5) - y_6 \geq 0$$

$$1 - y_1 - y_2 + 2 - 2y_3 - 4y_4 + 2 - 2y_5 + y_6 \leq 0$$

$$-y_1 - y_2 - 2y_3 - 4y_4 - 2y_5 + y_6 \leq -5$$

♦ مدل استاندارد

$$\max Z = 2y_1 - y_2 - 5y_3 - 3y_4 + 4y_5 - 8y_6 + 11$$

$$-3y_1 - 2y_2 - 7y_3 - 5y_4 - 4y_5 + 2y_6 \leq -8$$

$$-y_1 - y_2 - 2y_3 - 4y_4 - 2y_5 + y_6 \leq -5$$

$$y_j = 0 \vee 1$$

پنجشنبه، 05/03/2009

دکتر سلیمی فرد :: پژوهش عملیاتی 3 :: برنامه ریزی 0-1

11

حل مسئله استاندارد 0-1

♦ همانند شاخه و کران

♦ چون همه $C_j \leq 0$ ، تابع هدف max، پس $\max Z = 0$

♦ به شرط نبود عدد ثابت در تابع هدف

♦ چند اصطلاح

♦ حل جزئی (partial solution)

♦ برخی متغیرهای تصمیم مقدار (0 یا 1) داشته باشد

♦ متغیرهای ثابت (fixed variables)

♦ متغیرهایی که در حل جزئی به آنها مقدار تخصیص داده شود

♦ متغیرهای آزاد (free variables)

♦ متغیرهایی که در حل جزئی به آنها مقدار تخصیص نداده شود

♦ بر روی آنها شاخه زنی انجام نگرفته و تصمیمی برای 0 یا 1 بودن آنها گرفته نشده

پنجشنبه، 05/03/2009

دکتر سلیمی فرد :: پژوهش عملیاتی 3 :: برنامه ریزی 0-1

12

حل مسئله استاندارد 1-0

گره	حل جزئی	متغیر آزاد	متغیر ثابت
2	$P_2(-1)$	$F(1)$	x_1
3	$P_3(1)$	$F(1)$	x_1
5	$P_5(-1,2)$	$F(\varphi)$	x_1, x_2
7	$P_7(1,2)$	$F(\varphi)$	x_1, x_2

مجموعه متغیرهایی که بر روی آنها شاخه زنی نشده

$x_1=0: -1$
 $x_2=1: 2$

تابع هدف بر اساس جواب جزئی مربوطه

$Z + C_j \leq Z_L$

این ضابطه فقط با بدست آوردن یک جواب موجه Z_L بررسی می شود.

اگر متغیر آزادی با (1) و (2) کنار نرفت، متغیری که قدر مطلق مجموع مقادیر منفی متغیرهای کمکی را کمینه می کند انتخاب شود.

$$V_j = \sum_{i=1}^n \min(0, S_i - a_{ij})$$

دکتر سلیمی فرد :: پژوهش عملیاتی 3 :: برنامه ریوی 1-0 :: پنجشنبه، 05/03/2009 13

ضابطه های شاخه زنی در روش بالاس

- متغیر آزادی که در همه محدودیتها دارای متغیر کمکی منفی، ضریب آن مثبت است برای شاخه زنی انتخاب نشود
- افزودن این متغیرها به حل جزئی نمی تواند ناموجه بودن را بهتر کند
- اگر C_j برای متغیر آزاد X_j رابطه زیر را برآورد، آن متغیر برای شاخه زنی انتخاب نشود.

این ضابطه فقط با بدست آوردن یک جواب موجه Z_L بررسی می شود.

اگر متغیر آزادی با (1) و (2) کنار نرفت، متغیری که قدر مطلق مجموع مقادیر منفی متغیرهای کمکی را کمینه می کند انتخاب شود.

$$V_j = \sum_{i=1}^n \min(0, S_i - a_{ij})$$

دکتر سلیمی فرد :: پژوهش عملیاتی 3 :: برنامه ریوی 1-0 :: پنجشنبه، 05/03/2009 14

ضابطه های به ژرفا رسیدن

- مقدار تابع هدف گره کمتر از Z_L باشد.
- اگر تابع هدف با Z_L برابر باشد ← شاید بهینه چند گانه نرسیدن به جواب موجه معادل با رابطه زیر:

$$|S_i - \text{مربوط به هر گره}| < \left| \begin{matrix} \text{مجموع ضرایب منفی متغیرهای} \\ \text{آزاد مربوط به محدودیت } i \text{ ام} \end{matrix} \right|$$

- نبود متغیر آزاد
- دستیابی به یک جواب موجه

دکتر سلیمی فرد :: پژوهش عملیاتی 3 :: برنامه ریوی 1-0 :: پنجشنبه، 05/03/2009 15

گامهای الگوریتم شمارش ضمنی بالاس

- استاندارد سازی مدل
- تعریف یک حد پایینی Z_L با کمک جواب موجه.
- اگر چنین حدی نبود، $Z_L = -\infty$ ، (همه متغیرها آزادند)
- انتخاب متغیر شاخه زنی. (با کمک ضابطه های انتخاب)
- محاسبه تابع هدف، حل جزئی، متغیرهای آزاد، متغیرهای ثابت. اگر جواب موجه بهتر از Z_L باشد، جایگزین Z_L شود.
- بررسی ضابطه ژرفا
- اگر هیچ جواب جزئی نیست، ایست کنید. در غیر اینصورت به گام 3 بروید.

دکتر سلیمی فرد :: پژوهش عملیاتی 3 :: برنامه ریوی 1-0 :: پنجشنبه، 05/03/2009 16

مثال

مسئله زیر داده شده است.

$$\max Z = -8x_1 - 2x_2 - 4x_3 - 7x_4 - 5x_5$$

$$3x_1 + 3x_2 - x_3 - 2x_4 - 3x_5 \geq 2$$

$$5x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 - x_5 \geq 4$$

$$x_j = 0 \vee 1$$

دکتر سلیمی فرد :: پژوهش عملیاتی 3 :: برنامه ریوی 1-0 :: پنجشنبه، 05/03/2009 17

حل مثال

گام 1: استاندارد سازی محدودیتها و افزودن متغیرهای کمکی

$$\max Z = -8x_1 - 2x_2 - 4x_3 - 7x_4 - 5x_5$$

$$-3x_1 - 3x_2 + x_3 + 2x_4 + 3x_5 + S_1 = -2$$

$$-5x_1 - 3x_2 - 2x_3 - x_4 + x_5 + S_2 = -4$$

گام 2: همه متغیرها آزاد با مقدار صفر، متغیرهای کمکی منفی و نبود $Z_L = -\infty$ پس موجه، پس $Z_L = -\infty$

گام 3: انتخاب متغیر شاخه زنی.

- با توجه به ضابطه 1 x_5 انتخاب نمی شود (دارای ضریب مثبت در محدودیتهاست، به بهبود حل کمکی نمی کند)
- چون $Z_L = -\infty$ ، ضابطه 2 قابل کاربرد نیست

دکتر سلیمی فرد :: پژوهش عملیاتی 3 :: برنامه ریوی 1-0 :: پنجشنبه، 05/03/2009 18

حل مثال

بررسی ضابطه 3:

$$V_1 = \min \{0, S_1 - a_{11}\} + \min \{0, S_2 - a_{21}\} = \min \{0, -2 - (-3)\} + \min \{0, -4 - (-5)\} = 0$$

$$V_2 = \min \{0, -2 - (-3)\} + \min \{0, -4 - (-3)\} = -1$$

$$V_3 = \min \{0, -2 - (-1)\} + \min \{0, -4 - (-2)\} = -5$$

$$V_4 = \min \{0, -2 - (2)\} + \min \{0, -4 - (-1)\} = -7$$


$$\max Z = -8x_1 - 2x_2 - 4x_3 - 1x_4 - 5x_5$$

$$-3x_1 - 3x_2 + x_3 + 2x_4 + 3x_5 + S_1 = -2$$

$$-5x_1 - 3x_2 - 2x_3 - x_4 + x_5 + S_2 = -4$$


$$x_i = 0 \forall i$$

چون $\min |V_i| = V_1 = 0$ پس شاخه زنی بر روی x_1




حل مثال

- گام 4: چون مقادیر $S_i > 0$ مقدار Z_L به 8- افزایش می یابد. در این گره متغیرهای 2, 3, 4, 5 آزادند جواب جزئی دارای مقدار 1 برای x_1 است.
- گام 5: رسیدن به ژرفا در گره 1. بررسی ضابطه ژرفا برای گره 2.
- ضابطه 1) مقدار Z برابر با صفر، و کمتر از $Z_L = -8$ نیست. پس به ژرفا نرسیده است.
- ضابطه 2) بررسی امکان یافتن حل موجه برای گره 2 پس گره 2 به ژرفا نرسید.



حل مثال

- ضابطه 3 و 4) چون هم متغیر آزاد داریم و هم جواب گره موجه نیست، این گره به ژرفا نرسیده است.
- شاخه زنی بعدی بر روی همین گره



حل را ادامه دهید

حل مثال

- ضابطه 3 و 4) چون هم متغیر آزاد داریم و هم جواب گره موجه نیست، این گره به ژرفا نرسیده است.
- شاخه زنی بعدی بر روی همین گره 2 ← رفتن به گام 3:

$$Z_2 + C_2 \leq Z_L \quad 0 + (-2) \leq -8 \quad x_5 \text{ کنار گذاشتن}$$

$$Z_2 + C_3 \leq Z_L \quad 0 + (-4) \leq -8$$


$$Z_2 + C_4 \leq Z_L \quad 0 + (-7) \leq -8$$

همگی رد، هیچ متغیر آزادی را نمی توان کنار گذاشت.

حل مثال

محاسبه V_j ها

- $V_2 = -1, V_3 = -5, V_4 = -7$
- چون $\min \{V_i\} = V_2 = -1$ پس شاخه زنی بر روی x_2



حل مثال

- گام 4: محاسبه جواب مدل در هر گره، جواب هر دو گره ناموجه، پس نبود تغییر در Z_L
- گام 5: بررسی ژرفا ضابطه 1)

- مقدار تابع هدف گره 3 کمتر از Z_L نیست ← ژرفا نیست
- مقدار تابع هدف گره 4 کمتر از Z_L نیست ← ژرفا نیست
- ضابطه 2) گره 3: فقط $S_2 < 0$ ، پس فقط بررسی محدودیت دوم

$$|-2-1| \leq |-1|$$

$$|0| \leq |-2|$$

$$|-2-1| \leq |-4|$$

برآورده شدن ضابطه برای گره 4 :: رسیدن به ژرفا گره 4: $S_1, S_2 < 0$ ، بررسی هر دو محدودیت

حل مثال

گره 4 به ژرفا
گره 3 همچنان فعال :: شاخه زنی بر روی گره 3
برگشت به گام 3 الگوریتم

$Z=8$
 $S=(1,1)$
 $F=(2,3,4,5)$
 $P_1=(1)$

$Z=0$
 $S=(-2,-4)$
 $F=(2,3,4,5)$
 $P_2=(-1)$

$Z=-2$
 $S=(1,-1)$
 $F=(3,4,5)$
 $P_3=(-1,2)$

$Z=0$
 $S=(-2,-4)$
 $F=(3,4,5)$
 $P_4=(-1,-2)$

05/03/2009 پنجشنبه، دکتر سلیمی فرد :: پژوهش عملیاتی 3 :: برنامه ریزی 1-0 25

حل مثال

گام 3:

- $F_3=(3,4,5)$
- بکارگیری ضابطه 1 :: کنار گذاشتن X_5
- نبود جواب موجه :: بکارنگرفتن ضابطه 2
- بکارگیری ضابطه 3 :: محاسبه V_3 و V_4 :: انتخاب V_3 :: انتخاب X_3 و شاخه زنی بر روی X_3

05/03/2009 پنجشنبه، دکتر سلیمی فرد :: پژوهش عملیاتی 3 :: برنامه ریزی 1-0 26

حل مثال

$Z=8$
 $S=(1,1)$
 $F=(2,3,4,5)$
 $P_1=(1)$

$Z=0$
 $S=(-2,-4)$
 $F=(2,3,4,5)$
 $P_2=(-1)$

$Z=-2$
 $S=(1,-1)$
 $F=(3,4,5)$
 $P_3=(-1,2)$

$Z=0$
 $S=(-2,-4)$
 $F=(3,4,5)$
 $P_4=(-1,-2)$

05/03/2009 پنجشنبه، دکتر سلیمی فرد :: پژوهش عملیاتی 3 :: برنامه ریزی 1-0 27

حل مثال

گام 4: محاسبه جوابها

- ♦ فقط گره 5 موجه
- ♦ $Z_5 < Z_L$:: جایگزینی با Z_6 :: $Z_L = -6$
- ♦ گام 5: بررسی ژرفا
- ♦ گره 5: پاسخ موجه ← طبق ضابطه 4 رسیدن به ژرفا
- ♦ گره 6:
 - ♦ ضابطه 1: $Z_6 > Z_L$:: ژرفا نیست
 - ♦ ضابطه 2: $S_6=(1,-1)$:: بررسی محدودیت دوم
 - ♦ ضابطه 3: $F_6=(4,5)$:: ژرفا نیست
 - ♦ ضابطه 4: پاسخ موجه نیست ← ژرفا نیست

ژرفا نیست $|-1| < |-1|$

05/03/2009 پنجشنبه، دکتر سلیمی فرد :: پژوهش عملیاتی 3 :: برنامه ریزی 1-0 28

حل مثال

گام 6: بررسی شاخه زنی بر روی گره 6

- ضابطه 1: X_5 کنار گذاشته می شود
- ضابطه 2: تنها متغیر آزاد باقیمانده X_4
- ♦ شرط برقرار است ← کنارگذاشتن X_4
- ♦ نبود متغیر آزاد برای شاخه زنی
- ♦ ایست
- ♦ پاسخ بهینه مدل
- در گره 5

$X_6 = -2$
 $Z_6 + C_4 \leq Z_L$
 $-2 + (-7) \leq -6$

$X_1 = 0, X_2 = 1, X_3 = 1, X_4 = 0, X_5 = 0$
 $Z = -6$

05/03/2009 پنجشنبه، دکتر سلیمی فرد :: پژوهش عملیاتی 3 :: برنامه ریزی 1-0 29

برنامه ریزی صفر و یک

دکتر سلیمی فرد
 (PhD in Management Science, Petri Nets, Workflow,
 Lancaster University, UK, 2003)
 گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
<http://faculty.pgu.ac.ir/salimifard>